

医療保険有効を選択した場合の 診療・薬剤情報（処方・調剤情報）のシステム画面表示内容

※下記処方箋情報/調剤結果情報/レセプトに基づく薬剤実績は当該資格情報に紐づく情報の全量となります。下記が表示されている場合、閲覧テストが正常に実施されたものとご判断ください。なお、当該資格情報に対して処方箋情報/調剤結果情報/レセプトに基づく薬剤実績を自施設にて新たに登録した場合、それら情報も併せて表示されますので、ご注意ください。

| | |
|--|---|
| 患者情報 氏名：資格 一郎 カナ氏名：シカ 仔助 生年月日：1960年6月2日 年齢：65歳 | 保険者番号：139980 被保険者証等記号：葛う10 被保険者証等番号：AAAAAAAAAAx001 枝番：01 |
|--|---|

■ 処方箋情報

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|----------|---------------|------|------|--|---------------|
| テスト病院 | 24年 12月1日 | 院内 | 注射 | セファゾリンN a点滴静注用1gバッグオーツカ 生食100mL付 (セファゾリンナトリウム) 【点滴注射/投薬時点】 | 1袋 1処方分 |
| | | | | フィジオ140輸液 500mL (ブドウ糖加酢酸リンゲル) 【点滴注射/投薬時点】/[ゆっくりと] | 1袋 1処方分 |
| テスト病院 | 24年 11月15日 | 院内 | 内服 | ペリチーム配合顆粒 (膵臓性消化酵素配合剤) 【1日3回朝昼夕食後 服用/調剤時点】 | 3g 1日分 |
| | | | | ラックビー錠 (ビフィズス菌) 【1日3回朝昼夕食後 服用/調剤時点】 | 6錠 1日分 |
| | | | 屯服 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg (アセトアミノフェン) 【発熱時疼痛時/調剤時点】 | 2錠 3処方分 |
| | | | | 【般】テブレノンカプセル50mg (テブレノン) 【発熱時疼痛時/調剤時点】 | 1カプセル 3処方分 |

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/ 1回用量/ <用法等の特別指示> | 数量/単位 |
|----------|---------------|------|------|---|----------------|
| テスト病院 | 24年 11月1日 | 院内 | 内服 | ペリチーム配合顆粒 (膵臓性消化酵素配合剤) 【1日3回朝昼夕食後 服用/処方時点】 | 3g 3日分 |
| | | | | ラックビー錠 (ビフィズス菌) 【1日3回朝昼夕食後 服用/処方時点】 | 6錠 3日分 |
| | | | 屯服 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg (アセトアミノフェン) 【発熱時疼痛時/処方時点】 | 2錠 10処方分 |
| | | | | 【般】テブレノンカプセル50mg (テブレノン) 【発熱時疼痛時/処方時点】 | 1カプセル 10処方分 |
| テスト病院 | 24年 10月15日 | 院内 | 注射 | フィジオ35輸液 500mL (維持液(ブドウ糖加)) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7袋 1処方分 |
| | | | | プレアミン-P注射液 200mL (高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7袋 1処方分 |
| | | | | エレメンミック注 2mL (塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 3管 1処方分 |
| | | | | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」5,000単位 (ヘパリンナトリウム) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 2管 1処方分 |
| | | | | 在宅中心静脈栄養用輸液セット(本体) (-) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7セット 1処方分 |
| | | | | 在宅中心静脈栄養用輸液セット(付属品・輸液バッグ) (-) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7セット 1処方分 |

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|----------|--------------|------|------|--|---------------|
| テスト病院 | 24年 10月1日 | 入院 | 注射 | セファゾリンN a点滴静注用1g バッグオーツカ 生食100mL付 (セファゾリンナトリウム) 【点滴注射／投薬時点】 | 1袋 1処方分 |
| | | | | フィジオ140輸液 500mL (ブドウ糖加酢酸リンゲル) 【点滴注射／投薬時点】 / [ゆっくりと] | 1袋 1処方分 |
| テスト病院 | 23年 6月2日 | 院外 | 外用 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロール fumarate水和物) 【1日2回朝夕食後 服用】 | 56吸入 14処方分 |
| テスト病院 | 23年 6月1日 | 院外 | 屯服 | カロナール錠500 500mg (アセトアミノフェン) 【発熱時（以下の条件の場合） 服用】 / [粉碎][空腹時の服用は避ける] | 1錠 10処方分 |
| テスト病院 | 23年 5月1日 | 院外 | 内服 | ラベプラゾールナトリウム10mg錠 (ラベプラゾールナトリウム) 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | セルセプトカプセル250 250mg (ミコフェノール酸 モフェチル) 【1日2回朝夕食後 服用】 | 2錠 30日分 |
| | | | | フロセミド20mg錠 (-) 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |

■ 調剤結果情報

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|--------------|-------------|------|------|--|--------------|
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 8月2日 | 院外 | 外用 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 （フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物） 【1日2回朝夕食後 服用】 | 42吸引 1処方分 |
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 8月1日 | 院外 | 屯服 | カロナール錠500 500mg （アセトアミノフェン） 【発熱時（以下の条件の場合） 服用】 / [粉碎][空腹時の服用は避ける] | 1錠 10処方分 |
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 6月1日 | 院外 | 内服 | ラベプラゾールナトリウム10mg錠 （ラベプラゾールナトリウム） 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | ムコダイン錠500mg （L-カルボシステイン） 【1日2回朝夕食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | ムコダイン錠500mg （L-カルボシステイン） 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |

■レセプトに基づく薬剤実績

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|-----------|--------------|------|------|--|--------------|
| サンプル歯科C病院 | 23年 5月3日 | 院内 | 内服 | プリンペラン錠5 5mg (メトクロプラミド) | 1錠 7日分 |
| | | | | ジプレキサザイデイス錠2. 5mg (オランザピン) | 1錠 7日分 |
| | | | 外用 | プロベト (白色ワセリン) | 100g 1処方分 |
| サンプル歯科C病院 | 23年 5月1日 | 院内 | 注射 | メトクロプラミド注10mg「テバ」0.5%2mL (メトクロプラミド) | 1管 1回 |
| | | | | デキサート注射液6.6mg 2mL (デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム) | 0.5瓶 1回 |
| | | | | ラクテック注 1L (乳酸リンゲル) | 2袋 1回 |
| サンプル歯科D病院 | 23年 4月30日 | 入院 | 注射 | フロセミド注射液20mg「日医工」 (フロセミド) | 1管 1回 |
| | | | | メトクロプラミド注10mg「テバ」0.5%2mL (メトクロプラミド) | 3管 1回 |
| | | | | デキサート注射液6.6mg 2mL (デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム) | 0.5瓶 1回 |
| | | | | ラクテック注 1L (乳酸リンゲル) | 2袋 1回 |
| サンプル歯科A病院 | 23年 4月16日 | 入院 | 内服 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 (ロキソプロフェンナトリウム水和物) | 3錠 5日分 |
| サンプル歯科A病院 | 23年4月 15日 | 入院 | 屯服 | カロナール錠300 300mg (アセトアミノフェン) | 2錠 10処方分 |
| | | | 注射 | 生食注シリンジ「NP」10mL (生理食塩液) | 1筒 1回 |
| | | | | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 (クリンダマイシンリン酸エステル) | 1筒 1回 |

医療扶助有効（医科・歯科）を選択した場合の 診療・薬剤情報（処方・調剤情報）のシステム画面表示内容

※下記処方箋情報/調剤結果情報/レセプトに基づく薬剤実績は当該資格情報に紐づく情報の全量となります。下記が表示されている場合、閲覧テストが正常に実施されたものとご判断ください。なお、当該資格情報に対して処方箋情報/調剤結果情報/レセプトに基づく薬剤実績を自施設にて新たに登録した場合、それら情報も併せて表示されますので、ご注意ください。

| | |
|--|-----------------------------------|
| 患者情報 氏名：扶助 一色 カナ氏名：フジヨ イッセイ 生年月日：1973年12月1日 年齢：51歳 | 公費負担者番号：12991007 受給者番号：CCCCCC1 |
|--|-----------------------------------|

■ 処方箋情報

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|----------|---------------|------|------|---|---------------|
| テスト病院 | 24年 12月1日 | 院内 | 注射 | セファゾリンN a点滴静注用 1g バッグオーツカ 生食 100mL付 (セファゾリンナトリウム) 【点滴注射/投薬時点】 | 1袋 1処方分 |
| | | | | フィジオ140輸液 500mL (ブドウ糖加酢酸リンゲル) 【点滴注射/投薬時点】/[ゆっくりと] | 1袋 1処方分 |
| テスト病院 | 24年 11月15日 | 院内 | 内服 | ペリチーム配合顆粒 (膵臓性消化酵素配合剤) 【1日3回朝昼夕食後 服用/調剤時点】 | 3g 1日分 |
| | | | | ラックビー錠 (ビフィズス菌) 【1日3回朝昼夕食後 服用/調剤時点】 | 6錠 1日分 |
| | | | 屯服 | 【般】アセトアミノフェン錠 200mg (アセトアミノフェン) 【発熱時疼痛時/調剤時点】 | 2錠 3処方分 |
| | | | | 【般】テブレノンカプセル 50mg (テブレノン) 【発熱時疼痛時/調剤時点】 | 1カプセル 3処方分 |

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/ 1回用量/ <用法等の特別指示> | 数量/単位 |
|----------|---------------|------|------|---|----------------|
| テスト病院 | 24年 11月1日 | 院内 | 内服 | ペリチーム配合顆粒 (膵臓性消化酵素配合剤) 【1日3回朝昼夕食後 服用/処方時点】 | 3g 3日分 |
| | | | | ラックビー錠 (ビフィズス菌) 【1日3回朝昼夕食後 服用/処方時点】 | 6錠 3日分 |
| | | | 屯服 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg (アセトアミノフェン) 【発熱時疼痛時/処方時点】 | 2錠 10処方分 |
| | | | | 【般】テブレノンカプセル50mg (テブレノン) 【発熱時疼痛時/処方時点】 | 1カプセル 10処方分 |
| テスト病院 | 24年 10月15日 | 院内 | 注射 | フィジオ35輸液 500mL (維持液(ブドウ糖加)) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7袋 1処方分 |
| | | | | プレアミン-P注射液 200mL (高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7袋 1処方分 |
| | | | | エレメンミック注 2mL (塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 3管 1処方分 |
| | | | | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」5,000単位 (ヘパリンナトリウム) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 2管 1処方分 |
| | | | | 在宅中心静脈栄養用輸液セット(本体) (-) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7セット 1処方分 |
| | | | | 在宅中心静脈栄養用輸液セット(付属品・輸液バッグ) (-) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7セット 1処方分 |

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|----------|--------------|------|------|--|---------------|
| テスト病院 | 24年 10月1日 | 入院 | 注射 | セファゾリンN a点滴静注用1g バッグオーツカ 生食100mL付 (セファゾリンナトリウム) 【点滴注射／投薬時点】 | 1袋 1処方分 |
| | | | | フィジオ140輸液 500mL (ブドウ糖加酢酸リンゲル) 【点滴注射／投薬時点】 / [ゆっくりと] | 1袋 1処方分 |
| テスト病院 | 23年 6月2日 | 院外 | 外用 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物) 【1日2回朝夕食後 服用】 | 56吸入 14処方分 |
| テスト病院 | 23年 6月1日 | 院外 | 屯服 | カロナール錠500 500mg (アセトアミノフェン) 【発熱時（以下の条件の場合） 服用】 / [粉碎][空腹時の服用は避ける] | 1錠 10処方分 |
| テスト病院 | 23年 5月1日 | 院外 | 内服 | ラベプラゾールナトリウム10mg錠 (ラベプラゾールナトリウム) 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | セルセプトカプセル250 250mg (ミコフェノール酸 モフェチル) 【1日2回朝夕食後 服用】 | 2錠 30日分 |
| | | | | フロセミド20mg錠 (-) 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |

■ 調剤結果情報

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|--------------|-------------|------|------|--|--------------|
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 8月2日 | 院外 | 外用 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 （フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物） 【1日2回朝夕食後 服用】 | 42吸引 1処方分 |
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 8月1日 | 院外 | 屯服 | カロナール錠500 500mg （アセトアミノフェン） 【発熱時（以下の条件の場合） 服用】 / [粉碎][空腹時の服用は避ける] | 1錠 10処方分 |
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 6月1日 | 院外 | 内服 | ラベプラゾールナトリウム10mg錠 （ラベプラゾールナトリウム） 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | ムコダイン錠500mg （L-カルボシステイン） 【1日2回朝夕食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | ムコダイン錠500mg （L-カルボシステイン） 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |

■レセプトに基づく薬剤実績

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|-----------|--------------|------|------|--|--------------|
| サンプル歯科C病院 | 23年 5月3日 | 院内 | 内服 | プリンペラン錠5 5mg (メトクロプラミド) | 1錠 7日分 |
| | | | | ジプレキサザイデイス錠2. 5mg (オランザピン) | 1錠 7日分 |
| | | | 外用 | プロベト (白色ワセリン) | 100g 1処方分 |
| サンプル歯科C病院 | 23年 5月1日 | 院内 | 注射 | メトクロプラミド注10mg「テバ」0.5%2mL (メトクロプラミド) | 1管 1回 |
| | | | | デキサート注射液6.6mg 2mL (デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム) | 0.5瓶 1回 |
| | | | | ラクテック注 1L (乳酸リンゲル) | 2袋 1回 |
| サンプル歯科D病院 | 23年 4月30日 | 入院 | 注射 | フロセミド注射液20mg「日医工」 (フロセミド) | 1管 1回 |
| | | | | メトクロプラミド注10mg「テバ」0.5%2mL (メトクロプラミド) | 3管 1回 |
| | | | | デキサート注射液6.6mg 2mL (デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム) | 0.5瓶 1回 |
| | | | | ラクテック注 1L (乳酸リンゲル) | 2袋 1回 |
| サンプル歯科A病院 | 23年 4月16日 | 入院 | 内服 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 (ロキソプロフェンナトリウム水和物) | 3錠 5日分 |
| サンプル歯科A病院 | 23年4月 15日 | 入院 | 屯服 | カロナール錠300 300mg (アセトアミノフェン) | 2錠 10処方分 |
| | | | 注射 | 生食注シリンジ「NP」10mL (生理食塩液) | 1筒 1回 |
| | | | | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 (クリンダマイシンリン酸エステル) | 1筒 1回 |

医療扶助有効（薬局）を選択した場合の 診療・薬剤情報（処方・調剤情報）のシステム画面表示内容

※下記処方箋情報/調剤結果情報/レセプトに基づく薬剤実績は当該資格情報に紐づく情報の全量となります。下記が表示されている場合、閲覧テストが正常に実施されたものとご判断ください。なお、当該資格情報に対して処方箋情報/調剤結果情報/レセプトに基づく薬剤実績を自施設にて新たに登録した場合、それら情報も併せて表示されますので、ご注意ください。

| | |
|---|-----------------------------------|
| 患者情報 氏名：扶助 二葉 カナ氏名：フジヨ フカバ 生年月日：1973年12月1日 年齢：51歳 | 公費負担者番号：12991008 受給者番号：CCCCCC1 |
|---|-----------------------------------|

■ 処方箋情報

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|----------|---------------|------|------|---|---------------|
| テスト病院 | 24年 12月1日 | 院内 | 注射 | セファゾリンN a点滴静注用 1g バッグオーツカ 生食 100mL付 (セファゾリンナトリウム) 【点滴注射/投薬時点】 | 1袋 1処方分 |
| | | | | フィジオ140輸液 500mL (ブドウ糖加酢酸リンゲル) 【点滴注射/投薬時点】/[ゆっくりと] | 1袋 1処方分 |
| テスト病院 | 24年 11月15日 | 院内 | 内服 | ペリチーム配合顆粒 (膵臓性消化酵素配合剤) 【1日3回朝昼夕食後 服用/調剤時点】 | 3g 1日分 |
| | | | | ラックビー錠 (ビフィズス菌) 【1日3回朝昼夕食後 服用/調剤時点】 | 6錠 1日分 |
| | | | 屯服 | 【般】アセトアミノフェン錠 200mg (アセトアミノフェン) 【発熱時疼痛時/調剤時点】 | 2錠 3処方分 |
| | | | | 【般】テブレノンカプセル 50mg (テブレノン) 【発熱時疼痛時/調剤時点】 | 1カプセル 3処方分 |

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/ 1回用量 / <用法等の特別指示> | 数量/単位 |
|----------|---------------|------|------|---|----------------|
| テスト病院 | 24年 11月1日 | 院内 | 内服 | ペリチーム配合顆粒 (膵臓性消化酵素配合剤) 【1日3回朝昼夕食後 服用/処方時点】 | 3g 3日分 |
| | | | | ラックビー錠 (ビフィズス菌) 【1日3回朝昼夕食後 服用/処方時点】 | 6錠 3日分 |
| | | | 屯服 | 【般】アセトアミノフェン錠 200mg (アセトアミノフェン) 【発熱時疼痛時/処方時点】 | 2錠 10処方分 |
| | | | | 【般】テブレノンカプセル 50mg (テブレノン) 【発熱時疼痛時/処方時点】 | 1カプセル 10処方分 |
| テスト病院 | 24年 10月15日 | 院内 | 注射 | フィジオ35輸液 500mL (維持液(ブドウ糖加)) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7袋 1処方分 |
| | | | | プレアミン-P注射液 200mL (高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7袋 1処方分 |
| | | | | エレメンミック注 2mL (塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 3管 1処方分 |
| | | | | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」5,000単位 (ヘパリンナトリウム) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 2管 1処方分 |
| | | | | 在宅中心静脈栄養用輸液セット(本体) (-) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7セット 1処方分 |
| | | | | 在宅中心静脈栄養用輸液セット(付属品・輸液バッグ) (-) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7セット 1処方分 |

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|----------|--------------|------|------|--|---------------|
| テスト病院 | 24年 10月1日 | 入院 | 注射 | セファゾリンN a点滴静注用1g バッグオーツカ 生食100mL付 (セファゾリンナトリウム) 【点滴注射／投薬時点】 | 1袋 1処方分 |
| | | | | フィジオ140輸液 500mL (ブドウ糖加酢酸リンゲル) 【点滴注射／投薬時点】 / [ゆっくりと] | 1袋 1処方分 |
| テスト病院 | 23年 6月2日 | 院外 | 外用 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロール fumarate水和物) 【1日2回朝夕食後 服用】 | 56吸入 14処方分 |
| テスト病院 | 23年 6月1日 | 院外 | 屯服 | カロナール錠500 500mg (アセトアミノフェン) 【発熱時（以下の条件の場合） 服用】 / [粉碎][空腹時の服用は避ける] | 1錠 10処方分 |
| テスト病院 | 23年 5月1日 | 院外 | 内服 | ラベプラゾールナトリウム10mg錠 (ラベプラゾールナトリウム) 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | セルセプトカプセル250 250mg (ミコフェノール酸 モフェチル) 【1日2回朝夕食後 服用】 | 2錠 30日分 |
| | | | | フロセミド20mg錠 (-) 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |

■ 調剤結果情報

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|--------------|-------------|------|------|--|--------------|
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 8月2日 | 院外 | 外用 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 （フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物） 【1日2回朝夕食後 服用】 | 42吸引 1処方分 |
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 8月1日 | 院外 | 屯服 | カロナール錠500 500mg （アセトアミノフェン） 【発熱時（以下の条件の場合） 服用】 / [粉碎][空腹時の服用は避ける] | 1錠 10処方分 |
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 6月1日 | 院外 | 内服 | ラベプラゾールナトリウム10mg錠 （ラベプラゾールナトリウム） 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | ムコダイン錠500mg （L-カルボシステイン） 【1日2回朝夕食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | ムコダイン錠500mg （L-カルボシステイン） 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |

■レセプトに基づく薬剤実績

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|-----------|--------------|------|------|--|--------------|
| サンプル歯科C病院 | 23年 5月3日 | 院内 | 内服 | プリンペラン錠5 5mg (メトクロプラミド) | 1錠 7日分 |
| | | | | ジプレキサザイデイス錠2. 5mg (オランザピン) | 1錠 7日分 |
| | | | 外用 | プロベト (白色ワセリン) | 100g 1処方分 |
| サンプル歯科C病院 | 23年 5月1日 | 院内 | 注射 | メトクロプラミド注10mg「テバ」0.5%2mL (メトクロプラミド) | 1管 1回 |
| | | | | デキサート注射液6.6mg 2mL (デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム) | 0.5瓶 1回 |
| | | | | ラクテック注 1L (乳酸リンゲル) | 2袋 1回 |
| サンプル歯科D病院 | 23年 4月30日 | 入院 | 注射 | フロセミド注射液20mg「日医工」 (フロセミド) | 1管 1回 |
| | | | | メトクロプラミド注10mg「テバ」0.5%2mL (メトクロプラミド) | 3管 1回 |
| | | | | デキサート注射液6.6mg 2mL (デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム) | 0.5瓶 1回 |
| | | | | ラクテック注 1L (乳酸リンゲル) | 2袋 1回 |
| サンプル歯科A病院 | 23年 4月16日 | 入院 | 内服 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 (ロキソプロフェンナトリウム水和物) | 3錠 5日分 |
| サンプル歯科A病院 | 23年4月 15日 | 入院 | 屯服 | カロナール錠300 300mg (アセトアミノフェン) | 2錠 10処方分 |
| | | | 注射 | 生食注シリンジ「NP」10mL (生理食塩液) | 1筒 1回 |
| | | | | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 (クリンダマイシンリン酸エステル) | 1筒 1回 |

医療扶助医療保険有効（併用）を選択した場合の 診療・薬剤情報（処方・調剤情報）のシステム画面表示内容

※下記処方箋情報/調剤結果情報/レセプトに基づく薬剤実績は当該資格情報に紐づく情報の全量となります。下記が表示されている場合、閲覧テストが正常に実施されたものとご判断ください。なお、当該資格情報に対して処方箋情報/調剤結果情報/レセプトに基づく薬剤実績を自施設にて新たに登録した場合、それら情報も併せて表示されますので、ご注意ください。

| | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 患者情報 | | |
| 氏名：扶助 三葉 | 保険者番号：06140248 | 公費負担者番号：12BBB009 |
| カナ氏名：フジヨミツバ | 被保険者証等記号：10 | 受給者番号：CCCCCC1 |
| 生年月日：1974年12月1日 | 被保険者証等番号：AAAAAAAAAAx009 | |
| 年齢：50歳 | 枝番：01 | |

※システム上は医療保険の資格情報のみが表示され、薬剤情報についても医療保険の資格に紐づく情報が表示されます。

■ 処方箋情報

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|----------|---------------|------|------|---|---------------|
| テスト病院 | 24年 12月1日 | 院内 | 注射 | セファゾリンN a点滴静注用 1 g バッグオーツカ 生食 1 0 0 m L 付 (セファゾリンナトリウム) 【点滴注射／投薬時点】 | 1袋 1処方分 |
| | | | | フィジオ1 4 0 輸液 5 0 0 m L (ブドウ糖加酢酸リンゲル) 【点滴注射／投薬時点】 / [ゆっくりと] | 1袋 1処方分 |
| テスト病院 | 24年 11月15日 | 院内 | 内服 | ペリチーム配合顆粒 (膵臓性消化酵素配合剤) 【1日3回朝昼夕食後 服用／調剤時点】 | 3g 1日分 |
| | | | | ラックビー錠 (ビフィズス菌) 【1日3回朝昼夕食後 服用／調剤時点】 | 6錠 1日分 |
| | | | 屯服 | 【般】アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g (アセトアミノフェン) 【発熱時疼痛時／調剤時点】 | 2錠 3処方分 |
| | | | | 【般】テブレノンカプセル 5 0 m g (テブレノン) 【発熱時疼痛時／調剤時点】 | 1カプセル 3処方分 |

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/ 1回用量/ <用法等の特別指示> | 数量/単位 |
|----------|---------------|------|------|---|----------------|
| テスト病院 | 24年 11月1日 | 院内 | 内服 | ペリチーム配合顆粒 (膵臓性消化酵素配合剤) 【1日3回朝昼夕食後 服用/処方時点】 | 3g 3日分 |
| | | | | ラックビー錠 (ビフィズス菌) 【1日3回朝昼夕食後 服用/処方時点】 | 6錠 3日分 |
| | | | 屯服 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg (アセトアミノフェン) 【発熱時疼痛時/処方時点】 | 2錠 10処方分 |
| | | | | 【般】テブレノンカプセル50mg (テブレノン) 【発熱時疼痛時/処方時点】 | 1カプセル 10処方分 |
| テスト病院 | 24年 10月15日 | 院内 | 注射 | フィジオ35輸液 500mL (維持液(ブドウ糖加)) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7袋 1処方分 |
| | | | | プレアミン-P注射液 200mL (高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7袋 1処方分 |
| | | | | エレメンミック注 2mL (塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 3管 1処方分 |
| | | | | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」5,000単位 (ヘパリンナトリウム) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 2管 1処方分 |
| | | | | 在宅中心静脈栄養用輸液セット(本体) (-) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7セット 1処方分 |
| | | | | 在宅中心静脈栄養用輸液セット(付属品・輸液バッグ) (-) 【65mL/h 13時間/処方時点】 | 7セット 1処方分 |

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|----------|--------------|------|------|--|---------------|
| テスト病院 | 24年 10月1日 | 入院 | 注射 | セファゾリンN a点滴静注用1g バッグオーツカ 生食100mL付 (セファゾリンナトリウム) 【点滴注射／投薬時点】 | 1袋 1処方分 |
| | | | | フィジオ140輸液 500mL (ブドウ糖加酢酸リンゲル) 【点滴注射／投薬時点】 / [ゆっくりと] | 1袋 1処方分 |
| テスト病院 | 23年 6月2日 | 院外 | 外用 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロール fumarate水和物) 【1日2回朝夕食後 服用】 | 56吸入 14処方分 |
| テスト病院 | 23年 6月1日 | 院外 | 屯服 | カロナール錠500 500mg (アセトアミノフェン) 【発熱時（以下の条件の場合） 服用】 / [粉碎][空腹時の服用は避ける] | 1錠 10処方分 |
| テスト病院 | 23年 5月1日 | 院外 | 内服 | ラベプラゾールナトリウム10mg錠 (ラベプラゾールナトリウム) 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | セルセプトカプセル250 250mg (ミコフェノール酸 モフェチル) 【1日2回朝夕食後 服用】 | 2錠 30日分 |
| | | | | フロセミド20mg錠 (-) 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |

■ 調剤結果情報

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|--------------|-------------|------|------|--|--------------|
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 8月2日 | 院外 | 外用 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 （フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物） 【1日2回朝夕食後 服用】 | 42吸引 1処方分 |
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 8月1日 | 院外 | 屯服 | カロナール錠500 500mg （アセトアミノフェン） 【発熱時（以下の条件の場合） 服用】 / [粉碎][空腹時の服用は避ける] | 1錠 10処方分 |
| テスト薬局（テスト病院） | 23年 6月1日 | 院外 | 内服 | ラベプラゾールナトリウム10mg錠 （ラベプラゾールナトリウム） 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | ムコダイン錠500mg （L-カルボシステイン） 【1日2回朝夕食後 服用】 | 1錠 30日分 |
| | | | | ムコダイン錠500mg （L-カルボシステイン） 【1日1回朝食後 服用】 | 1錠 30日分 |

■レセプトに基づく薬剤実績

| 医療機関／薬局名 | 処方日 | 処方区分 | 使用区分 | 医薬品名 成分名 【用法】/1回用量/＜用法等の特別指示＞ | 数量/単位 |
|-----------|--------------|------|------|--|--------------|
| サンプル歯科C病院 | 23年 5月3日 | 院内 | 内服 | プリンペラン錠5 5mg (メトクロプラミド) | 1錠 7日分 |
| | | | | ジプレキサザイデイス錠2. 5mg (オランザピン) | 1錠 7日分 |
| | | | 外用 | プロベト (白色ワセリン) | 100g 1処方分 |
| サンプル歯科C病院 | 23年 5月1日 | 院内 | 注射 | メトクロプラミド注10mg「テバ」0.5%2mL (メトクロプラミド) | 1管 1回 |
| | | | | デキサート注射液6.6mg 2mL (デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム) | 0.5瓶 1回 |
| | | | | ラクテック注 1L (乳酸リンゲル) | 2袋 1回 |
| サンプル歯科D病院 | 23年 4月30日 | 入院 | 注射 | フロセミド注射液20mg「日医工」 (フロセミド) | 1管 1回 |
| | | | | メトクロプラミド注10mg「テバ」0.5%2mL (メトクロプラミド) | 3管 1回 |
| | | | | デキサート注射液6.6mg 2mL (デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム) | 0.5瓶 1回 |
| | | | | ラクテック注 1L (乳酸リンゲル) | 2袋 1回 |
| サンプル歯科A病院 | 23年 4月16日 | 入院 | 内服 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 (ロキソプロフェンナトリウム水和物) | 3錠 5日分 |
| サンプル歯科A病院 | 23年4月 15日 | 入院 | 屯服 | カロナール錠300 300mg (アセトアミノフェン) | 2錠 10処方分 |
| | | | 注射 | 生食注シリンジ「NP」10mL (生理食塩液) | 1筒 1回 |
| | | | | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 (クリンダマイシンリン酸エステル) | 1筒 1回 |